



Бешенство.

Бешенство – острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного, протекающее с тяжелым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Единственный способ спасти жизнь зараженного – это экстренная профилактика вакциной и иммуноглобулином до начала заболевания, пока вирус еще не проник в центральную нервную систему.

Заболевание людей связано с поздним обращением укушенных за медицинской помощью, с нарушением режима во время прививок или незавершенностью их курса. Большинство заболевших после контакта с больным животным и вовсе не обращались в медицинские учреждения.

Особенно опасны укусы в лицо, голову, шею, кисти рук и ног, а также зона промежности.

Источниками инфекции являются больные бешенством животные. Вирус бешенства сохраняется в природе у красной лисицы, затем передается волкам, шакалам, бродячим собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным. Инфицированные животные начинают выделять вирус за 7-8 дней до появления клинических признаков. Передача инфекции от животных к человеку осуществляется при укусах и ослюнении раны.

Вирус бешенства проникает через поврежденную кожу. В мышцах у места повреждения он размножается, затем по нервам распространяется в центральную нервную систему, а затем попадает в слюнные железы. Инкубационный период от 10 дней до 1 года, однако у детей инкубационный период длится короче, чем у взрослых. Заболевание начинается с головной боли, сухости в ротовой полости, сухого кашля, тошноты и рвоты. В месте укуса появляются жжения, тянущие боли, зуд. Место укуса краснеет и припухает. У больного возникает бессонница, беспричинный страх и чувство тоски. Через 2-3 дня нарастает тревога, появляется водобоязнь. При виде воды, ярком свете у больного появляются болезненные спазмы мышц глотки и гортани, шумное дыхание в виде судорожных вздохов. Нарушается сознание, появляются судороги и параличи, наступает смерть.

После укуса необходимо раны и места ослюнения обильно промыть струей воды с мылом, края раны обработать 70% спиртом или йодом, наложить стерильную повязку. Срочно обратиться в травматологический пункт или хирургический кабинет.

Чем раньше начаты прививки против бешенства, тем лучше. Антитела появляются через 12-14 дней после введения вакцины.

Мерами и предупреждения бешенства среди животных является обязательная ежегодная иммунизация домашних животных, надзор за бездомными собаками и кошками, и исключение контакта с дикими животными.